

**SINTOMÁTICO (CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO)**

📌 **CASO SUSPEITO:** apresentação de SÍNDROME GRIPAL ⇒ FEBRE e/ou SINTOMA RESPIRATÓRIO AGUDO NOS ÚLTIMOS 10 DIAS) - falta de ar, tosse, coriza/congestão nasal, dor de garganta, perda de olfato/paladar

📌 **CASO CONFIRMADO laboratorial:** Resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método RT-PCR em tempo real OU Resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de Imunocromatografia para detecção de antígeno

**EM ATENDIMENTO PRESENCIAL, REALIZAR COLETA OPORTUNA DO EXAME!!!** (coleta imediate se iniciou sintomas há menos de 7 dias)

**PARA AGENDAMENTO, REALIZAR EXAME RT-PCR OU ANTÍGENO PREFERENCIALMENTE ENTRE 3º E 7º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS**

Reforçar medidas de prevenção de **TRANSMISSÃO INTRADOMICILIAR** - distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, ambientes arejados, entre outros (ver Orientações para pessoas em Isolamento Domiciliar<sup>a</sup>)

	EXAME <sup>1</sup>	INTEPRETAÇÃO	ORIENTAÇÕES E CONDUTAS
<b>SINTOMÁTICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCR detectável</li> <li>• Antígeno reagente</li> </ul>	CASO CONFIRMADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas<sup>2</sup></li> <li>• Liberado do isolamento após completar o período determinado SE há 24h sem febre, sem uso de antitérmico E melhora dos sintomas respiratórios</li> <li>• SE permanecer com sintomas INCAPACITANTES após o período de isolamento, procurar atendimento médico presencial</li> <li>• Investigar contatos próximos e domiciliares e proceder conforme o caso</li> <li>• Orientar comunicação imediata ao local de trabalho /escola sobre caso positivo de COVID-19 para investigação de contatos próximos quanto à presença de sintomatologia e medidas de prevenção (quando pertinente)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCR não detectável</li> <li>• Antígeno não reagente</li> </ul>	Considerar possibilidade de falso negativo e período de incubação do vírus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas<sup>2, 3</sup></li> <li>• Liberado do isolamento SE há 24h sem febre, sem uso de antitérmico E melhora dos sintomas respiratórios</li> <li>• SE permanecer com sintomas INCAPACITANTES após o período de isolamento, procurar atendimento médico presencial</li> <li>• Investigar contatos próximos e domiciliares e proceder conforme o caso (ver p. 2)</li> <li>• Se trabalhador da saúde: retornar ao trabalho (com uso de EPI preconizado) SE há 24h sem febre, sem uso de antitérmico e com melhora clínica</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCR ou Antígeno não realizado</li> </ul>	CASO SUSPEITO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar PCR ou Antígeno até o 7º dia do início dos sintomas (em atendimento presencial fazer coleta oportuna, em agendamento, realizar preferencialmente entre 3º e 7º dia)</li> <li>• Isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas<sup>2</sup></li> <li>• Liberado do isolamento após completar período determinado SE há 24h sem febre, sem uso de antitérmico E melhora dos sintomas respiratórios</li> <li>• SE permanecer com sintomas INCAPACITANTES após o período de isolamento, procurar atendimento médico presencial</li> <li>• Investigar contatos próximos e domiciliares e proceder conforme o caso (ver p. 2)</li> </ul>

<sup>1</sup>TESTE SOROLÓGICO não deve ser utilizado para estabelecer diagnóstico de infecção ou reinfecção por SARS CoV-2 (COVID-19). Ver quadro Teste Sorológico, p. 3

<sup>2</sup>O tempo de isolamento é de 20 dias após o início dos sintomas para pessoas imunossuprimidas e/ou que necessitaram de internação ou tratamento de hipóxia aguda

<sup>3</sup>Caso a pessoa apresente um segundo PCR não detectável ou Antígeno negativo, coletado com intervalo mínimo de 24h do primeiro exame E há 24h sem febre, sem uso de antitérmico E AUSÊNCIA de qualquer sintoma sugestivo de COVID-19, será liberado do isolamento. Na UBS **NÃO é realizada** segunda coleta de PCR ou Antígeno para liberação antes do período de isolamento.

**ASSINTOMÁTICO NOS ÚLTIMOS 10 DIAS**

Para os casos assintomáticos, considerar **CONTATO PRÓXIMO** ou **DOMICILIAR** de caso suspeito ou confirmado

Reforçar medidas de prevenção de **TRANSMISSÃO INTRADOMICILIAR** - distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, ambientes arejados, entre outros (ver Orientações para pessoas em Isolamento Domiciliar<sup>a</sup>)

EXAME <sup>1</sup>	CONTATO PRÓXIMO OU DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO	INTERPRETAÇÃO	ORIENTAÇÕES E CONDUtas
PCR detectável Antígeno reagente	Independente	CASO CONFIRMADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolamento por 10 dias a partir da data da coleta do exame</li> <li>Liberação do isolamento após completar período determinado SE persistir assintomático</li> <li>SE apresentar febre e/ou sintomas respiratórios, PROLONGAR isolamento por mais 10 dias<sup>2</sup> a partir do início dos sintomas e contatar Central de Teleatendimento (3350-9000)</li> <li>Investigar contatos próximos e domiciliares e proceder conforme o caso</li> <li>Orientar comunicação imediata ao local de trabalho /escola sobre caso positivo de COVID-19 para investigação de contatos próximos quanto à presença de sintomatologia e medidas de prevenção (quando pertinente)</li> </ul>
			<p>PCR não detectável Antígeno não reagente</p> <td rowspan="2">SIM</td> <td rowspan="2">Considerar possibilidade de falso negativo e período de incubação do vírus</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se o exame foi realizado após 5 dias do contato com o caso índice, liberar do isolamento, caso contrário, manter isolamento de 10 dias após data de emissão do comunicado de isolamento do caso índice</li> <li>SE apresentar febre e/ou sintomas respiratórios, INICIAR/ PROLONGAR isolamento por 10 dias<sup>2</sup> a partir do início dos sintomas e contatar Central de Teleatendimento (3350-9000)</li> </ul> <p><b><u>SE TRABALHADOR DA SAÚDE E/OU CONTATO DOMICILIAR DE CASO CONFIRMADO, entre 18-40 anos, COM deslocamento para trabalho/estudo fora de casa:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Além das medidas anteriores, realizar Antígeno no 5º dia após data de emissão do comunicado de isolamento domiciliar do caso índice, registrar exame no e-Saúde e proceder conforme o resultado</li> </ul> </td>
PCR não realizado Antígeno não realizado	SIM	Considerar período de incubação do vírus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas de prevenção universais</li> <li>SE apresentar febre e/ou sintomas respiratórios, INICIAR isolamento domiciliar por 10 dias<sup>2</sup> e contatar Central de Teleatendimento (3350-9000)</li> </ul>
			NÃO
PCR não realizado Antígeno não realizado	SIM	Considerar período de incubação do vírus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas de prevenção universais</li> <li>SE apresentar febre e/ou sintomas respiratórios, INICIAR isolamento domiciliar por 10 dias<sup>2</sup> e contatar Central de Teleatendimento (3350-9000)</li> </ul>
			NÃO

<sup>1</sup>TESTE SOROLÓGICO não deve ser utilizado para estabelecer diagnóstico de infecção ou reinfecção por SARS CoV-2 (ver p. 4)

<sup>2</sup>O tempo de isolamento é de 20 dias após o início dos sintomas para pessoas imunossuprimidas e/ou que necessitaram de internação ou tratamento de hipóxia aguda

☛ **CONTATO PRÓXIMO:** Contato físico direto; contato direto desprotegido com secreções infecciosas; contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros, sem uso de máscara; esteve em ambiente fechado (Ex.: sala de aula, sala de reunião, local de trabalho, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros, sem máscara; cuidou diretamente de uma pessoa com COVID-19 sem uso de EPI; esteve em uma aeronave, sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquer direção) de uma pessoa com COVID-19; acompanhantes ou cuidadores e tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que a pessoa com COVID-19 estava sentada.

☛ **CONTATO DOMICILIAR:** Reside na mesma casa/ambiente – inclui colegas de dormitório, creche, alojamento, etc.

**TESTE SOROLÓGICO**

**O teste sorológico não deve ser utilizado para estabelecer diagnóstico de infecção ou reinfecção por SARS CoV-2 (COVID-19). Para diagnóstico, realizar RT-PCR ou Antígeno**

SOROLOGIA	QUADRO CLÍNICO	ORIENTAÇÕES E CONDUtas
<ul style="list-style-type: none"> <li>IgG positivo com IgM positivo</li> </ul>	SINTOMÁTICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas<sup>1</sup></li> <li>Realizar exame PCR/Antígeno e reavaliar como SINTOMÁTICO (ver p. 1)</li> <li>Liberação do isolamento após completar o período determinado SE há 24h sem febre, sem uso de antitérmico E melhora dos sintomas respiratórios</li> <li>SE permanecer com sintomas INCAPACITANTES após o período de isolamento, procurar atendimento médico presencial</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>IgG positivo com IgM negativo</li> <li>IgG negativo com IgM positivo</li> <li>IgG negativo com IgM negativo</li> <li>Teste rápido positivo</li> <li>Teste rápido negativo</li> </ul>	ASSINTOMÁTICO CONTATO PRÓXIMO/DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolamento por 10 dias a partir da data de emissão do comunicado de isolamento do caso índice</li> <li>Reforçar medidas de prevenção de TRANSMISSÃO INTRADOMICILIAR: distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, ambientes arejados, entre outros (ver Orientações para pessoas em Isolamento Domiciliar<sup>3</sup>)</li> <li>Avaliar <b>critério</b> para teste de Antígeno - <b>TRABALHADOR DA SAÚDE e/ou CONTATO DOMICILIAR, entre 18 e 40 anos, COM deslocamento para trabalho/estudo fora de casa de caso confirmado</b>: realizar Antígeno e proceder conforme o resultado do exame (Assintomático, p. 2)</li> <li>Se apresentar febre e/ou sintomas respiratórios, PROLONGAR isolamento domiciliar por 10 dias a partir do início dos sintomas<sup>1</sup> e entrar em contato com a Central de Teleatendimento - 3350-9000</li> </ul>
	ASSINTOMÁTICO <u>NÃO</u> CONTATO PRÓXIMO/DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabe ao profissional de saúde solicitante avaliar o resultado e tomar as condutas e medidas necessárias para evitar a transmissão da doença</li> <li>Para interpretação, orientações e condutas, necessário considerar: história clínica pregressa, exames e contatos prévios e a possibilidades de resultados falso positivo ou falso negativo, entre outros</li> </ul>

<sup>1</sup>O tempo de isolamento é de 20 dias após o início dos sintomas para pessoas **imunossuprimidas** e/ou que **necessitaram** de internação ou tratamento de hipóxia aguda