

ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO NA UPA

CONTRAÇÕES UTERINAS DOLORAS, REGULARES EM TEMPO, INTENSIDADE E EM DURAÇÃO.

+
AMNIOREXE

AFERIR DADOS VITAIS.
VERIFICAR IDADE GESTACIONAL.
AVALIAR OS BATIMENTOS CARDIO-FETAIS (BCF).
COLOCAR PACIENTE EM DECÚBITO LATERAL ESQUERDO

TOQUE VAGINAL

- Avaliar integridade das membranas fetais, caso estas estejam rotas, definir há quanto tempo e descrever o aspecto do líquido amniótico;
- Avaliar se existe sangramento vaginal e sua característica;
- Avaliar a dilatação, o comprimento, a consistência, a posição e o apagamento cervical, a altura da apresentação, a situação, a posição e a apresentação fetal.

CALCULAR ESCORE DE MALINAS

ESCORE/ VALOR	NÚMERO DE PARTOS PRÉVIOS	DURAÇÃO DO TRABALHO DE PARTO	DURAÇÃO DAS CONTRAÇÕES	INTERVALO ENTRE 2 CONTRAÇÕES	TEMPO DE AMNIOREXE
0	1	< 3 HORAS	< 1 MINUTO	> 5 MINUTOS	NEGA
1	2	3 A 5 HORAS	1 MINUTO	3 A 5 MINUTOS	RECENTE (< 1 HORA)
2	> 2	> 6 HORAS	> 1 MINUTO	< 3 MIN (AO MENOS 2 EM 5 MIN)	> 1 HORA

ESCORE < 5

ORIENTAR PROCURAR MATERNIDADE DE REFERÊNCIA.

(AVALIAR RISCO SOCIAL E NECESSIDADE DE ACIONAR CTS PARA TRANSPORTE)

ESCORE ENTRE 5 E 7

ACIONAR PROTOCOLO DO SAMU 3360-4980

- DEITAR PACIENTE EM DECÚBITO LATERAL ESQUERDO.
- ACESSO VENOSO PERIFÉRICO.
- VERIFICAR BCF A CADA 20 MIN.
- AVALIAR DINÂMICA UTERINA (CONTRATILIDADE, INTENSIDADE E FREQUÊNCIA DAS CONTRAÇÕES)

ESCORE > 7

PERÍODO EXPULSIVO?

NÃO

SIM

PREPARO DA EQUIPE PARA PARTO IMINENTE:

- TRANQUILIZAR A GESTANTE; FRASES DE INCENTIVO/APOIO; GARANTIR PRIVACIDADE;
- ESTIMULAR RESPIRAÇÃO CONTROLADA;
- EVITAR TOQUES VAGINAIS FORA DA CONTRAÇÃO UTERINA;
- VERIFICAR BCF A CADA 5 MIN;
- REALIZAR MANOBRA PARA DESPRENDIMENTO FETAL.
- AVALIAR RESPIRAÇÃO DO BEBÊ/ CHORO;
- AQUECER, SECAR E COLOCAR O BEBÊ EM CONTATO PELE A PELE COM O MÃE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL;
- ESPERAR 1 A 2 MIN PARA CLAMPEAR CORDÃO UMBILICAL;
- APLICAR OCITOCINA 10UI IM NA MÃE;
- REALIZAR TRACÇÃO CONTROLADA DO CORDÃO ATÉ DEQUITAÇÃO COMPLETA;
- ENCAMINHAR PLACENTA EM UM SACO PARA MATERNIDADE JUNTO COM MÃE E BEBÊ.
- APLICAR VITAMINA K 1 mg IM NO RECÉM NASCIDO.

+
ACIONAR PROTOCOLO DO SAMU 3360-4980 PARA TRANSFERÊNCIA APÓS O PARTO
SE GESTAÇÃO ≤ 34 SEMANAS: SOLICITAR AMBULÂNCIA NEONATAL

PERÍODO EXPULSIVO DO TRABALHO DE PARTO:

- DILATAÇÃO TOTAL DO COLO (10 cm);
- ESFORÇO EXPULSIVO MATERNO (PUXOS);
- SENSAÇÃO DE PREENCHIMENTO RETAL;
- O BEBÊ TORNA-SE VISÍVEL/ PALPÁVEL.