DOR ABDOMINAL EM PEDIATRIA

ANAMNESE

- **Tempo de início da dor:** aguda (< 7 dias)/ não aguda (> 7 dias)/ crônica ou recorrente (>2 meses);
- **Característica da dor:** localização/ irradiação/ intensidade/ duração/ evolução/ fatores desencadeantes ou agravantes/ fatores de alívio;
- **Sintomas associados:** náuseas/ vômitos/ diarreia/ obstipação /disúria/ urgência miccional/ febre/ diminuição do ganho de peso ou emagrecimento/ hiporexia ou anorexia/ icterícia/ prurido/ manchas pelo corpo/ dor articular/ dor anal/ prurido anal/ sede excessiva/ saída de vermes nas fezes;

EXAME FÍSICO

- Criança deve estar totalmente sem roupa para o exame físico;
- Avaliar: estado de alerta, hidratação de mucosas, turgor da pele, ausculta pulmonar, exame abdominal completo, oroscopia, otoscopia, exame do períneo, exame de genitália (torção testicular);
- Anotar: temperatura axilar, frequência respiratória, saturação de O2 (SatO2), **glicemia capilar;**
- Procurar possíveis sinais de abuso.

SINAIS DE ALERTA

- Aspecto toxêmico;
- Prostração acentuada, letargia ou coma;
- Rebaixamento do nível de consciência;
- Hipoxemia (SatO2 ≤92%aa);
- Esforço respiratório (tiragem subcostal/ retração supraesternal);
- Taquipneia

Idade	Taquipnéia
< 2 M	> 60 ipm
2M-1A	> 50 ipm
1 A- 2A	> 40 ipm
3-5A	> 30 ipm
>5A	>25ipm



***MANEJO CLÍNICO:**

- 2 ACESSOS VENOSOS CALIBROSOS
- O2 SUPLEMENTAR 2L/MIN SE SO2< 92%;
- MONITORAR DADOS VITAIS;
- **HIDRATAÇÃO**:
  - SF 0,9% 20ML/KG EM 30 MIN, REPETINDO ATÉ REIDRATAÇÃO COMPLETA.
- **SINTOMÁTICOS:**
  - DIPIRONA 500MG/ML IV OU IM 15MG/KG/DOSE, SE FEBRE OU DOR
  - METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 0,1MG/KG/DOSE , SE VÔMITOS

OU

  - DIMENIDRATO 50MG/ML IM 1MG/KG/DOSE (> 2 ANOS)

GANHO DE PESO E EXAME FÍSICO NORMAL:

- PSICOSOMÁTICA;
- DISPEPSIA FUNCIONAL;
- SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL;
- ENXAQUECA ABDOMINAL;
- DOR ABDOMINAL FUNCIONAL DA INFÂNCIA;
- CONSTIPAÇÃO.

DIMINUIÇÃO DO GANHO DE PESO OU PERDA DE PESO:

- DOENÇA DO REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO (DRGE);
- ITU (*VER FLUXO ITU*);
- DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL (DII);
- DOENÇA CELÍACA;
- PARASITOSE INTESTINAL;
- INTOLERÂCIA A LACTOSE;
- ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA.

GECA:
VER FLUXO DE DIARREIA EM PEDIATRIA

ITU:
VER FLUXO DE ITU EM PEDIATRIA

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS:

- IVAS
- AMIGDALITE
- RINOSSINUSITE
- AMIGDALITE
- OTITE MÉDIA AGUDA
- COVID-19

ver fluxo geral de atendimento doença respiratória- covid-19 e influenza