FEBRE (TEMPERATURA AXILAR ≥ 37.8ºC)

ANAMNESE

- **IDADE;**
- **TEMPO DE INÍCIO;**
- **SINTOMAS ASSOCIADOS:** TOSSE/ DIARREIA/ VÔMITOS/ DOR DE GARGANTA/ MANCHAS PELO CORPO/ PRURIDO/ DOR ABDOMINAL/ DOR EM MEMBRO / ALTERAÇÃO DA MARCHA/ DOR DE OUVIDO/ CHORO;
- **EPIDEMIOLOGIA:** CONTATO COM PESSOAS DOENTES/ VIAGEM/ USO DE MEDICAÇÃO/ AVALIAR SITUAÇÃO VACINAL;

EXAME FÍSICO

- CRIANÇA DEVE ESTAR TOTALMENTE SEM ROUPA PARA O EXAME FÍSICO;
- AVALIAR: ESTADO DE ALERTA, HIDRATAÇÃO DE MUCOSAS;
- PELE: (MANCHAS/ PETÉQUIAS/ VESÍCULAS/ EXANTEMAS), FONTANELAS, OTOSCOPIA, OROSOCPIA, PALPAR LINFONODOS, AUSCULTA PULMONAR E CARDÍACA, EXAME ABDOMINAL COMPLETO (INCLUSIVE CICATRIZ UMBILICAL), EXAME DA GENITÁLIA;
- PROCURA POR SINAIS MENÍNGEOS (LACTENTE PODE NÃO APRESENTAR);
- ANOTAR: FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FREQUENCIA CARDÍACA (APÓS DIMINUIÇÃO DA FEBRE);

SINAIS DE ALERTA:

- ASPECTO TOXÊMICO;
- PROSTRAÇÃO ACENTUADA, LETARGIA OU COMA;
- REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA;
- SINAIS MENINGEOS;

***MANEJO CLÍNICO:**

- 2 ACESSOS VENOSOS CALIBROSOS;
- O2 SUPLEMENTAR 2L/MIN SE SO2< 92%;
- MONITORAR DADOS VITAIS;
- **HIDRATAÇÃO**:
  - SF 0,9% 20ML/KG EM 30 MIN, REPETINDO SE NECESSÁRIO;
- **SINTOMÁTICOS:**
  - DIPIRONA 500MG/ML IV OU IM 15MG/KG/DOSE, SE FEBRE OU DOR
  - METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 0,1MG/KG/DOSE , SE VÔMITOS

OU

  - DIMENIDRATO 50MG/ML IM 1MG/KG/DOSE (> 2 ANOS)

****PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR:**

- HEMOGRAMA;
- PROTEÍNA-C-REATIVA (PCR);
- UROFITA/ URINA TIPO 1;
- RAIO-X TORAX;
- INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA PARA SAR-COV-2 E INFLUENZA(*ver fluxo geral de atendimento doença respiratória- covid-19 e influenza*

SINAIS DE ALERTA? — SIM → MANEJO CLÍNICO * + DISCUTIR COM REGULAÇÃO DO SAMU *3360-4980*

NÃO

CRIANÇA < 30 DIAS? — SIM → REFERENCIAR PARA MATERNIDADE DISCUTIR COM REGULAÇÃO DO SAMU *3360-4980*

NÃO

IDENTIFICADO FOCO DA FEBRE? — SIM → **MANEJO CLÍNICO INDIVIDUALIZADO**:

- IVAS
- AMIGDALITE
- COVID-19
- GECA
- PNEUMONIA
- ITU
- OTITE MÉDIA AGUDA
- ARBOVIROSE
- ...

NÃO

- **CRIANÇA > 1 E < 3 MESES** → PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR** + MEDICAR PACIENTE NA UPA COM PARACETAMOL 200MG/ML: 1 GOTA/KG, SE NECESSÁRIO
- **CRIANÇA > 3 E < 36 MESES** → **VACINAÇÃO COMPLETA?**
  - NÃO → PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR**
  - SIM → **FEBRE > 48H?**
    - SIM → PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR**
    - NÃO → REALIZAR **UROFITA**
- **CRIANÇA > 36 MESES** → AVALIAR **ANAMNESE E EXAME FÍSICO.** PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR** EMPÍRICA NÃO ESTÁ INDICADA NESTA FAIXA ETÁRIA

REALIZAR **UROFITA**

- SE EXAME COM LEUCOCITÚRIA E/ OU NITRITO POSITIVO: *VER FLUXO DE ITU*
- SE EXAME NORMAL:
  - PRESCREVER ANTITÉRMICOS: (PARACETAMOL 200MG/ML 1 GOTA/KG DE 6/6H
  - ORIENTAR RETORNO A CADA 24H NA UPA OU NA APS (COM REFERÊNCIA)
  - ORIENTAR RETORNO IMEDIATO NA US/ UPA, SE SINAIS DE ALERTA.
- CRIANÇAS COM FEBRE > 7 DIAS, DEVEM SER REFERENCIADAS PARA APS PARA INVESTIGAÇÃO