HEMORRAGIA DIGESTIVA

ANAMNESE

- **TEMPO DE INÍCIO;**
- **QUEIXA:** DOR ABDOMINAL, HEMATÊMESE, HEMATOQUEZIA, MELENA;
- **CLASSIFICAÇÃO:** ALTA/ BAIXA;
- **ALTA:** ÚLCERA PÉPTICA, MEDICAMENTOSA, VARIZES ESOFÁGICAS (POR HIPERTENSÃO DO SISTEMA PORTA: CIRROSE/ ESQUISTOSSOMOSE/ TROMBOSE PORTO-ESPLÊNICA), MALLORY-WEISS;
- **BAIXA:** ÚLCERAS INTESTINAIS, ANGIODISPLASIA, NEOPLASIA;
- **FATORES DE RISCO:** ETILISMO, USO DE MEDICAÇÕES (AINES, ANTI-COAGULANTES), HEPATOPATIAS, CARDIOPATIAS, NEFROPATIAS;
- **AFASTAR SITUAÇÕES EXTRA-ABDOMINAIS DE FEZES ENEGRECIDAS:** SANGUE DEGLUTIDO POR EPISTAXE, USO DE SULFATO FERROSO, CARVÃO OU ALGUNS VEGETAIS (ESPINAFRE);

EXAME FÍSICO

- **VERIFICAÇÃO DE DADOS VITAIS;**
- **EXAME ABDOMINAL:** AVALIAR PRESENÇA DE PERITONITE, SINAIS DE HEPATOPATIA CRÔNICA (ASCITE/ TELANGIECTASIAS);
- **EXAME DO PERÍNEO:** AFASTAR CAUSAS ORIFÍCIAS DE SANGRAMENTOS (FISSURAS/ HEMORRÓIDAS);
- **TOQUE RETAL:** PESQUISA DE SANGUE VIVO NA PONTA DO DEDO.

SINAIS DE INSTABILIDADE:

- TAQUICARDIA (FC > 100bpm)
- TAQUIPNÉIA (FR ≥ 22iRpm)
- REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA
- HIPÓXIA (SO₂ < 90%)
- HIPOTENSÃO (PAS < 90mmHg)
- DIMINUIÇÃO DA PERFUSÃO DISTAL (TEC > 3SEG)

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA:

- HEMATÊMESE PRESENCIADA;
- PRESENÇA DE SANGUE VIVO EM SONDA NASOGÁSTRICA;
- HEMATOQUEZIA PRESENCIADA;
- MELENA PRESENCIADA;
- MELENA NO TOQUE RETAL;
- SANGUE VIVO NA PONTA DO DEDO AO TOQUE RETAL (EXCLUÍDO CAUSAS ORIFÍCIAS).

*MANEJO CLÍNICO

- 2 ACESSOS VENOSOS CALIBROSOS;
- O₂ SUPLEMENTAR (SE SO₂ < 90%);
- CONSIDERAR PASSAR SONDA NASOGÁSTRICA;
- IOT (SOMETE SE SANGRAMENTO VULTUOSO OU REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA);
- EXPANSÃO VOLÊMICA COM SF0,9% OU RINGER LACTATO;
- OMEPRAZOL 80MG IV EM BOLUS SEGUIDO DE 40MG 12/12HS;
- METOCLOPRAMIDA 5MG/ML IV;
- ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML- 500MG IV (50MG/MIN);
- *SE CIRROSE/ ASCITE: CEFTRIAXONA 2G/ DIA IV (PROFILAXIA DE PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA)