



JUSTIFICATIVA TÉCNICA – CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG **(correspondente a 500mg de cálcio) PARA USO EM** **GESTANTES**

DIANTE DE 1 FATOR DE ALTO RISCO OU DA COMBINAÇÃO DE DOIS FATORES DE RISCO MODERADO, DEVE-SE INICIAR A PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA COM AAS + CÁLCIO.

Assinalar abaixo os fatores de risco:

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À PRÉ-ECLÂMPSIA		
RISCO		APRESENTAÇÃO CLÍNICA E/OU OBSTÉTRICA
ALTO		HISTÓRIA DE PRÉ-ECLÂMPSIA, PRINCIPALMENTE ACOMPANHADA DE DESFECHOS ADVERSOS
		GESTAÇÃO MÚLTIPLA
		OBESIDADE (IMC > 30)
		HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA
		DIABETES TIPO 1 OU 2
		DOENÇA RENAL
		DOENÇAS AUTOIMUNES (EX.: LÚPUS, SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE)
MODERADO		NULIPARIDADE
		HISTÓRIA FAMILIAR DE PRÉ-ECLÂMPSIA (MÃE E/OU IRMÃS)
		BAIXO NÍVEL SOCIOECONÔMICO
		ETNIA AFRODESCENDENTE
		IDADE ≥ 35 ANOS
		HISTÓRIA PESSOAL DE BAIXO PESO AO NASCER
		GRAVIDEZ PRÉVIA COM DESFECHO ADVERSO
		INTERVALO > 10 ANOS DESDE A ÚLTIMA GESTAÇÃO

Carimbo e assinatura do Médico Assistente